

HEEFT U
ADDISONS
ONTDEKT?

ZYCORTAL®
ONZICHTBARE ZIEKTE. DUIDELIJK ANTWOORD.

Zycortal® in de praktijk

Voorheen geen
behandeling

Voorheen alleen
fludrocortison

Voorheen fludrocortison
en cortison

Dag 1 voor alle patiënten - Startdosering Zycortal® - 2,2 mg/kg - subcutane toediening

Dag 1 - Geef naast Zycortal® ook 2 x daags 0,25-0,5 mg/kg cortison acetaat.

Dag 1 - Dien de fludrocortison toe zoals voorheen.

Dag 1 - Dien de fludrocortison en de cortison acetaat toe zoals voorheen.

Op dag 10 en dag 28 na de eerste injectie Zycortal® worden de elektrolyten bepaald en de hond klinisch onderzocht. Bekijk de '5 gouden regels' voor meer informatie over aanpassing van de dosering.

Dag 2 - Halveer de oorspronkelijke dosis van fludrocortison en geef 2 x daags 0,25-0,5 mg/kg cortison acetaat.

Dag 2 - Halveer de oorspronkelijke dosis van fludrocortison en verhoog de dosis van cortison acetaat naar 2x daags 0,25-0,5 mg/kg (indien de patiënt nog een lagere dosis kreeg).

Dag 3 - Geef ¼ van de oorspronkelijke dosis van fludrocortison en geef de cortison acetaat verder zoals hierboven beschreven.

Dag 3 - Geef ¼ van de dosis van de fludrocortison en geef de cortison acetaat verder zoals hierboven beschreven.

Dag 4 - Stop met de fludrocortison en geef de cortison acetaat verder zoals hierboven beschreven.

Dag 4 - Stop met de fludrocortison en geef de cortison acetaat verder zoals hierboven beschreven.

Zycortal 25 mg/ml suspensie voor injectie met verlengde afgifte voor honden
Desoxycortonpivalaat
UDA - REG NL 115531