

Cystophan® Nieuw

Voor een **hoogwaardige ondersteuning** van de normale functie van de **urinewegen**.

Aanvullend diervoeder met **glycosaminoglycanen (GAG)** uit **twee bronnen**.

- Voor het behoud van een **sterke GAG-laag in de blaas**.
- **L-Tryptofaan** helpt bij de regulatie van een normaal stressniveau.



Iedere capsule bevat:

- **N-Acetyl-D-Glucosamine**, 125 mg
- **Hyaluronzuur**, 10 mg
- **L-tryptofaan**, 37.5 mg



Makkelijk te voeren met **capsules** met synthetische kipsmaak voor een **uitstekende smaak** en goede acceptatie.




Dechra

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD)

– Ziekte van de lagere urinewegen bij katten

De meest voorkomende oorzaak van FLUTD bij katten jonger dan 10 jaar is feline idiopathische cystitis (FIC).¹

Feline Idiopathische Cystitis (FIC):

Men denkt dat FIC het gevolg is van complexe interacties tussen verschillende orgaansystemen, waaronder de blaas, het zenuwstelsel en andere externe factoren.

Het slijmvlies van de urinewegen wordt bedekt door een beschermende barrière van **glycosaminoglycanen** (GAG).

Deze laag bestaat uit **hyaluronzuur** en aan elkaar geketende suikereenheden, waaronder **N-Acetyl-D-Glucosamine**. Het draagt ertoe bij dat irriterende substanties in de urine het gevoelige urotheel niet bereiken.

Stress is een trigger en versterker van FIC. Die **stressregulatie** is een belangrijk startpunt in de management van FIC.

L-Tryptofaan kan door de kat omgezet worden in serotonine.

Serotonine is een neurotransmitter die de gemoedstoestand, stress en angst reguleert.

¹Buffington CA & Chew DJ (2007) BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology.

